

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO A SCAFOIDEO

(cicalina della flavescenza dorata della vite)
(determinazione del SFR n. 8072 del 19/05/2016)

**È obbligatorio nelle aree vitate della provincia di Reggio Emilia
eseguire 1 trattamento insetticida.**

**Nei vigneti a conduzione biologica sono obbligatori almeno 2 trattamenti. Anche
nei vigneti campi di piante madri ne sono obbligatori due.**

L'intervento ha valore legale di lotta obbligatoria se effettuato tra il 10 giugno e il 10 luglio 2016 (per i vigneti con obbligo di 2 trattamenti il limite ultimo per il secondo trattamento è il 31 luglio).

Periodo d'intervento consigliato: 20-30 giugno 2016

È possibile utilizzare:

- ✓ acetamiprid e thiamethoxam nei primi giorni del periodo consigliato;
- ✓ clorpirifos, clorpirifos metile o etofenprox negli ultimi giorni del periodo;
- ✓ buprofezin circa 7-10 giorni prima del periodo consigliato, seguito da un secondo trattamento abbattente da effettuare all'incirca un mese dopo.

**Nei vigneti a conduzione biologica intervenire con piretrine due
o tre volte ogni 10 giorni da inizio periodo consigliato.**

**E' VIETATO TRATTARE CON INSETTICIDI E ACARICIDI QUANDO LE
COLTURE E IL COTICO SOTTOSTANTE SONO IN FIORITURA.**

**PER MEGLIO TUTELARE GLI INSETTI PRONUBI TRINCIARE L'ERBA
SOTTO AL VIGNETO 1-2 GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO.**

AVVISARE IL VICINO APICOLTORE!

NOTA BENE

- **Attenzione ai prodotti microincapsulati**, possono arrecare gravi danni alle api.
- **Per coloro che aderiscono ai diversi regolamenti** di produzione si raccomanda di fare riferimento ai relativi disciplinari.
- **Etofenprox** in produzione integrata volontaria è utilizzabile per cicaline.
- **Un ulteriore trattamento** insetticida contro il vettore della flavescenza (posizionato circa 30 giorni dopo) può essere utile in caso di:
 - ✓ Elevate popolazioni iniziali di scafoideo
 - ✓ Alta incidenza della malattia
 - ✓ Vigneti in allevamento.
- **Negli interventi con piretrine** acidificare l'acqua (pH 5,5-6) e trattare verso sera.
- **Le aziende agricole che non sono “biologiche”** ma che intendano usare le piretrine dovranno eseguire almeno i due interventi obbligatori previsti per i vigneti a conduzione biologica.
- **Vista la predilezione delle forme giovanili** a stazionare sulle foglie più basse, si può meglio colpire la cicalina dirigendo i getti dell'atomizzatore anche sugli eventuali polloni.
- **Alternare i prodotti** a modalità d'azione differente.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
AL PROPRIO TECNICO DI FIDUCIA O
AL CONSORZIO FITOSANITARIO
(ANCHE SUL SITO INTERNET www.fitosanitario.re.it)**