

Tasso di perdita multiregionale delle colonie di api durante l'inverno 2016/17 dall'indagine COLOSS in Italia

Vengono presentati i tassi di perdita delle colonie di api durante l'inverno 2016/17 ottenuti con il questionario COLOSS in 12 regioni italiane. Sfortunatamente, non tutte le regioni italiane hanno risposto e in alcuni casi le risposte fornite non sono state considerate complete o valide. I 395 apicoltori che hanno fornito dati di perdita validi hanno invernato complessivamente 13.392 colonie e riportato 916 (6,8%, intervallo di confidenza al 95% (95% IC): 6,0-7,8%) colonie con problemi di regina irrisolvibili e 1.455 (10,9%, IC 95%: 9,6 - 12,3%) colonie morte dopo l'inverno. Inoltre, le colonie perse a causa di calamità naturali ammontavano a 195 (1,5%, 95% CI: 1,1-1,9%). Ciò si traduce in un tasso di perdita globale del 19,2% (95% IC: 17,5-20,9%) delle colonie di api durante l'inverno 2016/17, con differenze marcate tra le regioni. La provincia di Trento e la regione Sicilia hanno registrato rispettivamente il 28,3% (IC 95%: 18,9% - 40,2%) e il 2,3% (IC 95%: 1,1 - 4,8%) di colonie morte dopo l'inverno; la provincia di Trento e il Piemonte hanno registrato il 18,1% (IC 95%: 11,4 - 27,5%) e lo 0,5% (IC 95%: 0,0 - 18,0%) rispettivamente di colonie con problemi di regina irrisolvibili. Il peggior tasso di perdita complessivo pari al 46,4% (95% IC: 34,7 - 58,6%) è stato segnalato in provincia di Trento mentre il più basso, 10,7% (95% IC: 7,1 - 15,7%) in Emilia Romagna. Nel complesso, il nomadismo non ha avuto effetti significativi sul rischio di perdita invernale. I dati raccolti attraverso il questionario COLOSS sembrano interessanti e potrebbero fortemente contribuire alla conoscenza del fenomeno delle perdite invernali di colonie. Si auspica, ancora una volta, una partecipazione più ampia al questionario, ormai attivo dal 2008, poiché chi ha risposto al questionario rappresenta attualmente meno dell'1% del totale degli apicoltori italiani.

Tabella 2. Riassunto dei dati relativi alle perdite invernali di colonie di api raccolti in Italia attraverso il questionario Coloss

Regione	N. apicoltori che hanno risposto	N. colonie produttive prima dell'inverno 2016-2017	Tasso di mortalità (%) - colonie perse perché morte (95% CI)	Tasso di mortalità (%) - colonie perse per problemi della regina (95% CI)	Tasso di mortalità (%) - colonie perse per calamità naturali (95% CI)	Tasso mortalità complessiva (%) - perdite invernale (95% CI)
Abruzzo	14	834	7.2 (4.2 – 12.1)	4.2 (2.2 – 7.7)	2.8 (1.3 – 5.9)	14.1 (9.6 – 20.3)
Basilicata	76	2340	11.1 (8.6 – 14.2)	7.8 (5.9 – 10.1)	2.9 (1.8 – 4.5)	21.8 (18.2 – 25.7)
Emilia-Romagna	15	1018	8.6 (5.5 – 13.2)	2.1 (0.9 – 4.6)	0.0 (na)	10.7 (7.1 – 15.7)
Friuli Venezia Giulia	3	1134	13.5 (9.7 – 18.4)	0.0 (na)	0.0 (na)	13.5 (9.6 – 18.6)
Lombardia	149	1862	16.2 (12.9 – 20.2)	8.3 (6.2 – 11.0)	0.4 (0.1 – 1.6)	25.0 (20.8 – 29.6)
Marche	32	2188	6.7 (4.8 – 9.4)	8.5 (6.5 – 11.0)	1.1 (0.5 – 2.3)	16.3 (13.1 – 20.0)
Piemonte	5	193	13.5 (5.9 – 27.7)	0.5 (0.0 – 18.0)	0.0 (na)	14.0 (6.2 – 28.8)
Sardegna	1	11	0.0 (na)	0.0 (na)	0.0 (na)	0.0 (na)
Sicilia	3	1423	2.3 (1.1 – 4.8)	7.7 (5.5 – 10.8)	3.5 (2.1 – 5.9)	13.6 (10.1 – 18.0)
Trentino Alto Adige	10	321	28.3 (18.9 – 40.2)	18.1 (11.4 – 27.5)	0.0 (na)	46.4 (34.7 – 58.6)
Umbria	1	2	0.0 (na)	0.0 (na)	0.0 (na)	0.0 (na)
Veneto	86	2066	14.3 (11.3 – 17.9)	8.1 (6.2 – 10.7)	1.2 (0.5 – 2.5)	23.6 (19.7 – 27.9)
Totale	395	13392	10.9 (9.6-12.3)	6.8 (6.0-7.8)	1.5 (1.1-1.9)	19.2 (17.5-20.9)

(na): non disponibile

Relazione presentata alla 13th Coloss Conference, Athens (Greece), 2-3 novembre 2017. Mutinelli F., Barzon L., Maroni Ponti A., Toson M. Multi-region loss rates of honey bee colonies during winter 2016/17 from the COLOSS survey in Italy.