

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO A SCAFOIDEO

(cicalina della flavescenza dorata della vite)
(determinazione del SFR n. 7488 del 21/05/2018)

**Su tutta la provincia di Reggio Emilia è obbligatorio
effettuare 1 trattamento contro lo scafoideo.**

**Nei vigneti a conduzione biologica sono obbligatori
almeno 2 trattamenti.**

Nei vigneti campi di piante madri ne sono obbligatori due.

L'intervento ha valore di lotta obbligatoria se effettuato tra il 14 giugno e il 10 luglio
(se vi è l'obbligo di 2 trattamenti il limite per il secondo è il 5 agosto).

**Periodo d'intervento consigliato:
20-30 giugno 2018**

È possibile utilizzare:

- ✓ acetamiprid e thiamethoxam nei primi giorni del periodo consigliato;
- ✓ clorpirifos metile o etofenprox negli ultimi giorni consigliati.

**Nei vigneti a conduzione biologica intervenire con piretrine due
o tre volte ogni 10 giorni a partire dal 14 giugno.**

**È VIETATO TRATTARE CON INSETTICIDI E ACARICIDI QUANDO LE
COLTURE E IL COTICO SOTTOSTANTE SONO IN FIORITURA.**

**PER MEGLIO TUTELARE GLI INSETTI PRONUBI TRINCIARE L'ERBA
SOTTO AL VIGNETO 1-2 GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO.**

AVVISARE IL VICINO APICOLTORE!

NOTA BENE

- **Clorpirifos etile:** dal 6 giugno, per effetto del Regolamento (UE) 2018/686 del 4 maggio 2018, che ne cambia il limite massimo di residuo ammesso, il prodotto non è più utilizzabile in post-fioritura.
- **Un ulteriore trattamento** insetticida contro il vettore della flavescenza (posizionato circa 30 giorni dopo) può essere utile in caso di:
 - ✓ Elevate popolazioni iniziali di scafoideo
 - ✓ Alta incidenza della malattia
 - ✓ Vigneti in allevamento.
- **Negli interventi con piretrine** acidificare l'acqua (pH 5,5-6) e trattare verso sera.
- **Le aziende agricole che non sono “biologiche” ma che intendano usare le piretrine** dovranno eseguire almeno i due interventi obbligatori previsti per i vigneti a conduzione biologica.
- **Vista la predilezione delle forme giovanili a stazionare sulle foglie più basse**, si può meglio colpire la cicalina dirigendo i getti dell'atomizzatore anche sugli eventuali polloni presenti.
- **Alternare i prodotti** a modalità d'azione differente.
- **Per coloro che aderiscono ai diversi regolamenti** di produzione o afferiscono a Cantine dotate di un proprio disciplinare si raccomanda di fare riferimento ad essi.
- **Distanze minime rispetto a corpi idrici rilevanti** superficiali: prestare attenzione ad eventuali prescrizioni di etichetta.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
AL PROPRIO TECNICO DI FIDUCIA O
AL CONSORZIO FITOSANITARIO
(Anche sul sito internet www.fitosanitario.re.it e su
Fitogram_bot nell'app Telegram)**