

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO A SCAFOIDEO

(cicalina della flavescenza dorata della vite)
(determinazione del SFR n. 8073 del 10/05/2019)

**In provincia di Reggio Emilia effettuare un trattamento.
Nei vigneti a conduzione biologica sono obbligatori
almeno 2.**

Anche nei vigneti campi di piante madri ne sono obbligatori due.

L'intervento ha valore legale di lotta obbligatoria se effettuato tra il 17 giugno e il 15 luglio (il limite per l'eventuale secondo trattamento obbligatorio è il 10 agosto).

**Periodo d'intervento consigliato:
1-7 luglio 2019**

È possibile utilizzare: acetamiprid, acrinatrina, clorpirifos metile, etofenprox, flupyradifurone (nei primi giorni del periodo consigliato) o tau-fluvalinate.

Nei vigneti a conduzione biologica intervenire due o tre volte ogni 10 giorni a partire da fine giugno con piretrine o sali potassici degli acidi grassi.

**È VIETATO TRATTARE CON INSETTICIDI E ACARICIDI QUANDO LE
COLTURE E IL COTICO SOTTOSTANTE SONO IN FIORITURA.**

**PER MEGLIO TUTELARE GLI INSETTI PRONUBI TRINCIARE L'ERBA
SOTTO AL VIGNETO 1-2 GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO.**

AVVISARE IL VICINO APICOLTORE!

NOTA BENE

- **Un ulteriore trattamento** insetticida contro il vettore della flavescenza (posizionato circa 30 giorni dopo) **può essere utile in caso di:**
 - Elevate popolazioni iniziali di scafoideo
 - Alta incidenza della malattia
 - Vigneti in allevamento.
- **Negli interventi con piretrine** acidificare l'acqua (pH 5,5-6) e trattare verso sera.
- **Le aziende agricole che non sono “biologiche” ma che intendano usare le piretrine** dovranno eseguire almeno i due interventi obbligatori previsti per i vigneti a conduzione biologica.
- **Vista la predilezione delle forme giovanili a stazionare sulle foglie più basse**, si può meglio colpire la cicalina dirigendo i getti dell'atomizzatore anche sugli eventuali polloni presenti.
- **Alternare i prodotti** a modalità d'azione differente.
- **Per coloro che aderiscono ai diversi regolamenti** di produzione o afferiscono a Cantine dotate di un proprio disciplinare si raccomanda di fare riferimento ad essi nella scelta della sostanza attiva.
- **Distanze minime rispetto a corpi idrici rilevanti** superficiali: prestare attenzione ad eventuali prescrizioni di etichetta.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
AL PROPRIO TECNICO DI FIDUCIA O
AL CONSORZIO FITOSANITARIO**

**(Anche sul sito internet www.fitosanitario.re.it e su
[Fitogram_bot](#) nell'app Telegram)**